



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



ALUFOS 56

Fosfuro de aluminio

Fumigante

Pastillas

Fosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-FUMI-0407-320-095-056

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

FOSFURO DE ALUMINIO: Fosfuro de aluminio
(Equivalente a 560 g de I.A./Kg)

56.00

Ingredientes Inertes.

Diluyente bloqueador de la inflamación y protector de la humedad

44.00

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

ALUFOS 56 es un fumigante agrícola a base de fosfuro de aluminio en pastillas para el control de plagas en granos almacenados de maíz, en silos o a granel.

REG_FT_037

Versión. V00

Fecha de elaboración. 28.OCT.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**

El fosforo de aluminio genera un gas extremadamente tóxico, únicamente deberá ser utilizado por personas adultas debidamente instruidas, capacitadas y familiarizadas con las medidas seguras de uso, estas actividades deben ser supervisadas. Utilice el equipo de protección personal específico para gas fosfina, mascara y filtros adecuados, escafandras, ropa de algodón, guantes de neopreno y botas de seguridad. Al término de la aplicación lavarse manos y partes del cuerpo que hayan tenido contacto con el producto. Cuando se entre a un lugar fumigado, se deberá ingresar con el equipo de protección personal antes indicado, hacerlo por parejas. Todas las estructuras colindantes deberán mantenerse ventiladas, no realizar tratamientos si las mismas se encuentran habitadas.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PRODUCTO	PLAGA Nombre común (Nombre científico)	DOSIS	OBSERVACIONES
Granos almacenados de maíz en silos o a granel.	Gorgojo del maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>)	2 - 6 pastillas /m ³	a) Agregar las pastillas o comprimidos a intervalos regulares durante el proceso de llenado. b) En el caso de que el grano esté almacenado, introducir las pastillas o comprimidos a éste mediante una sonda y hermetizar. c) En el caso de silos, usar de ser posible un distribuidor automático.
Estibas de grano de maíz ensacado y/o encostado.		2 - 4 pastillas /m ³	Colocar las pastillas o comprimidos de ALUFOS 56 separados unos de otros sobre cartones a modo de bandejas, alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre estos y la lona, con el fin de facilitar la generación del gas asegurando una perfecta hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo.

TIEMPO DE REENTRADA.

Después de 6 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Por ser un producto en forma de pastillas esféricas se aplica de diversas maneras, de acuerdo a las condiciones y formas de las estructuras y materias primas o materiales a fumigar, siempre buscando la activación de estas pastillas de manera homogénea. Evitar acumulaciones de pastillas.

PRODUCTOS A GRANEL:

En el momento del llenado de las bodegas y/o silo emplear un equipo para distribuir homogéneamente las pastillas, su distribución e inyección deberá ser adecuada para el tipo de almacenamiento.

PRODUCTOS ENCOSTALADOS, EN CAJAS O TAMBORES:

Colocar las pastillas, sobre recipientes que no sean buenos conductores de calor, como cartón, evitando acumulación de pastillas y manejar una correcta distribución. Utilizar dosis adecuadas por metro cubico de espacio a fumigar. Evitar la humedad.

ESPACIOS Y LOCALES VACÍOS:

Colocar la cantidad correcta de pastillas, sobre recipientes de cartón, adecuadamente distribuidos por todo el espacio del local y/o espacio vacío.





Ficha Técnica

INSECTICIDAS



CONTRAINDICACIONES.

No fumigar cuando la temperatura sea inferior a 5 °C. No usar en presencia de agua o en riesgo de contacto con agua.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos que contengan agua.

MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

