



Ficha

Técnica

INSECTICIDAS



METRIFOS 600 TRIDENTE

Metamidofos "Uso restringido"

Insecticida / Acaricida

Líquido miscible

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-INAC-0144-302-012-048

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

METAMIDOFOS.

48.00

O,S-Dimetil fosforo amidotioato

Equivalente a 600 g de I.A/L a 20°C

Ingredientes Inertes.

Diluyentes, coadyuvantes y compuestos relacionados

52.00

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

METRIFOS 600 TRIDENTE, es un producto formulado como Líquido miscible a base de Metamidofos, que actúa como Insecticida y/o Acaricida sistémico con acción por contacto y acción estomacal.

REG_FT_056

Versión. V00

Fecha de elaboración. 12.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



[calidad_tridente](https://www.instagram.com/calidad_tridente)



Agroquímica
Tridente

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**

Use el equipo de protección de uso exclusivo para el manejo de plaguicidas adecuado, completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de este producto: mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, gorra de algodón o capucha que cubra hasta la nuca y/o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón de manga larga o tyvek sobre la ropa para evitar infiltración del producto al cuerpo. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado. Báñese y póngase ropa limpia. La ropa y overol utilizados durante la aplicación deben lavarse bien por separado con agua y jabón. Una vez seca, almacenar la ropa y todo el equipo de protección limpio en el lugar de trabajo.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha
Algodonero (50)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Trips (<i>Hercotrips</i> spp), Pulga saltona (<i>Pseudatomoscelis seriatus</i>), Chinche (<i>Dysdercus</i> spp)	1.0 – 1.5
Brócoli (21)	Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Pulga saltona (<i>Phyllotreta</i> spp), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Mariposita blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>), Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>), Chinche arlequín de la col (<i>Murgantia histrionica</i>)	
Chile (14)	Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp), Chicharrita (<i>Eutettix tenellus</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>), Pulga saltona negra (<i>Epitrix</i> sp), Doradilla (<i>Diabrotica</i> spp), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>)	
Col (35)	Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Pulga saltona (<i>Phyllotreta</i> spp), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Mariposita blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>), Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>), Chinche arlequín de la col (<i>Murgantia histrionica</i>)	
Col de Bruselas (35)		
Coliflor (28)		
Jitomate (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp), Chicharrita (<i>Eutettix tenellus</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>), Pulga saltona negra (<i>Epitrix</i> sp), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>), Trips de las flores (<i>Frankliniella tritici</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.0
Lechuga (14)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Pulgón del algodón y del melón (<i>Aphis gossypii</i>), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>)	1.0 – 1.5
Melón (1)	Araña mexicana del maíz (<i>Oligonychus mexicanus</i>), Barrenador del fruto (<i>Diaphania</i> spp), Barrenador del melón (<i>Diaphania nitidalis</i>), Chicharrita (<i>Empoasca</i> sp, <i>Empoasca abrupta</i>), Diabrotica (<i>Diabrotica</i> spp), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>); Minador de la hoja (<i>Liriomyza pusilla</i>); Minador serpentina de las hojas (<i>Liriomyza pusilla</i>), Pulgón de algodón (<i>Aphis gossypii</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0
Pepino (3)		
Sandía (1)		
Papa (14)	Gusano trozador (<i>Peridroma saucia</i>), Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Chinche ligus (<i>Lygus lineolaris</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> sp), Catarinita de la papa (<i>Leptinotarsa undecemlineata</i>)	1.0 – 1.5

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite





Ficha

Técnica

INSECTICIDAS

**TIEMPO DE REENTRADA.**

24 horas después de la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Repetir la aplicación con intervalos de 5 a 7 días hasta controlar la infestación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE.

Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

METRIFOS 600 TRIDENTE es un líquido miscible, que debe de diluirse en agua antes de aplicarse. La aplicación puede ser mediante aspersores manuales o mecánicos, o por avión. Se recomienda diluir 150 mL en 100 L de agua para aplicaciones en pequeñas superficies.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando haya vientos fuertes; evite el ingreso a las áreas tratadas hasta pasadas 24 horas de la aplicación; asegurar que no se contaminen cultivos vecinos.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos de reacción alcalina, ni con Diazinón.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_056

Versión. V00

Fecha de elaboración. 12.NOV.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente