



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



ZOLEKUR 250 CE

tebuconazol

Fungicida

Concentrado emulsionable

Triazol

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-FUNG-0349-X0697-09-24.85

TITULAR DE REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

TEBUCONAZOL: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol
Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C

24.85

Ingredientes Inertes.

Materiales portadores y tensoactivo

75.15

TOTAL

100.00

MODO DE ACCIÓN.

ZOLEKUR 250 CE, es un producto formulado como CONCENTRADO EMULSIONABLE a base de TEBUCONAZOL, que actúa como fungicida sistémico con acción protectora y curativa de los cultivos. Que por su acción erradicante es utilizado para tratar las enfermedades en los cultivos

REG_FT_075

Versión. V00

Fecha de elaboración. 25.NOV.2025

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: mascarilla de cara completa con respiradores y filtros para vapores, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Después de la jornada de trabajo, descontamine el equipo de aplicación.

CUADRO DE CULTIVOS, PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Cultivos	Plagas	Dosis	Observaciones
Soya (30), Frijol (30), Chicharo (30), Frijol Ejotero (30), Alubia (30), Haba (30), Garbanzo (30), Lenteja (30), Cacahuete (30)	Mancha púrpura (<i>Cercospora kikuchii</i>)	0.4-0.6 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de manchas purpuras; volumen de aplicación 330-430 L de agua/ha.
Cebada (30)	Roya (<i>Puccinia sp.</i>)	0.5 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de manchas purpuras; volumen de aplicación 330-430 L de agua/ha. Aplicación al follaje.
Calabaza (7), Calabacita (7), Pepino (7), Melón (7), Sandía (7), Chayote (7)	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0.4-0.6 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 300-400 L de agua/ha

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas después de la última aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Forma de abrir el envase: Agite el producto antes de abrir. Use el equipo de protección adecuado, en buen estado, limpio y completo el cual consiste en: mascarilla de cara completa con respiradores y filtros para vapores, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno.

Preparación de ZOLEKUR 250 CE®: Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua. Mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Agregar el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua de los lavados al tanque, completar hasta su capacidad total con agua manteniendo en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día de su preparación.

Debe aplicarse en forma de aspersión con equipo terrestre o aéreo asegurando un cubrimiento total y uniforme de las plantas tratadas, evitando los escurrimientos. Las aplicaciones foliares deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para

REG_FT_075

Versión. V00

Fecha de elaboración. 25.NOV.2025

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

FUNGICIDAS



lograr el cubrimiento completo del follaje, la cantidad de agua dependerá del equipo de aplicación, tipo de boquilla y el tamaño del cultivo.

Después de usar su equipo de aplicación, efectuar el triple lavado. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.

CONTRAINDICACIONES.

No aplique con vientos superiores a 8 km/hora.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar ZOLEKUR 250 CE® con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

