



# Ficha Técnica

## FUNGICIDAS



### COTRI FLOW

Oxicloruro de cobre

Fungicida

Suspensión Acuosa

Fungicida cúprico

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  
RSCO-FUNG-0328-326-008-023

DISTRIBUIDO POR:  
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

#### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

##### Ingrediente Activo.

OXICLORURO DE COBRE.

Equivalente a 175 g de I.A/L

22.73

##### Ingredientes Inertes.

Diluyente, humectante, preservativo y dispersante

77.27

**TOTAL** 100.00

#### MODO DE ACCIÓN.

**COTRI FLOW**, es un producto formulado como suspensión acuosa a base de OXICLORURO DE COBRE, que actúa como fungicida; el cobre absorbido altera los sistemas enzimáticos de los patógenos y posee actividad multisitio.

REG\_FT\_DIS\_006

Versión. 00

Fecha de elaboración. 17.ABR.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha Técnica

## FUNGICIDAS



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones.

Para su manejo y aplicación use gorra, mascarilla, guantes, botas, lentes, protectores y overol.

Aplique siempre a favor del viento. No permita que le bañe la aspersion. No contamine fuentes y depósitos de agua.

### CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	Plaga Nombre Común <i>Nombre científico</i>	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Aguacate	<b>Antracnosis o roña</b> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	300 a 400 ml. en 100lt agua	Inicie aplicaciones al inicio de la brotación repita a las cuatro semanas con un máximo de cuatro aplicaciones
Pepino Calabaza Melón Sandía	<b>Cenicilla vellosa</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <b>Antracnosis</b> <i>Colletotrichum lagenarium</i> <b>Alternaria</b> <i>Alternaria uccumerina</i> <b>Pudrición bacteriana</b> <i>Erwinia sp</i>	2.5 a 3.0	Iniciar aplicaciones cuando las plantas empiecen a guiar y repetir cada 7-10 días una aplicación al suelo después de sembrar, pero antes de que emerjan plantas puede ayudar a reducir infecciones de mancha angular.
Chile	<b>Antracnosis</b> <i>Colletotrichum capsici</i> <b>Cercospora</b> <i>Cercospora capsici</i> <b>Tizón temprano</b> <i>Alternaria solani</i> <b>Mancha bacteriana</b> <i>Xanthomonas vesicatoria</i>	2.5	Se pueden iniciar aplicaciones en almácigo y el campo al aparecer los primeros síntomas y repetir cada 7-10 días.
Frijol	<b>Antracnosis</b> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <b>Cenicilla vellosa</b> <i>Shaperoteca humulii</i> <b>Mancha angular</b> <i>Isariopsis griseola</i> <b>Tizón bacteriano</b> <i>Xanthomonas vesicatoria</i>	1.5-2.0	Iniciar aplicaciones cuando las plantas tengan 6 cm. de altura y repetir a intervalos de 7 días.
Cítricos	<b>Melanosis</b> <i>Diaporthe citri</i> <b>Roña</b> <i>Elsinoe fawcetti</i> <b>Mancha grasienta</b> <i>Mycosphaerella spp</i>	300 a 400 ml. en 100lt agua (5 lt/ha max)	Para la melanosis aplicar de 1 a 3 semanas después de la caída de los pétalos. Para Roña se hacen dos aplicaciones, la primera antes de floración y la segunda antes de la caída de los pétalos.





# Ficha Técnica

## FUNGICIDAS



### TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas.

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

Producto exento de tolerancia de residuos e intervalo de seguridad sin límite.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En un tambo de 200 Lt agregue agua hasta la mitad de su capacidad. Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria. Aplique de inmediato. Cada vez que llene el aspersor, deberá agitar la mezcla preparada. COTRI FLOW es un fungicida preventivo, para obtener mejores resultados, debe aplicarse antes de que aparezcan los primeros síntomas, o bien, cuándo las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo y diseminación de las enfermedades. Aplíquese con el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del follaje. Úsese las dosis mayores en cultivo en pleno desarrollo o con abundante follaje.

### CONTRAINDICACIONES.

No aplicar **COTRI FLOW** cuando amenace la lluvia o esté presente, dado que su acción desprende el producto de la superficie del follaje. No se aplique en Durazno y Manzano después de la ruptura de yema.

### INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda hacer mezclas con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desee hacer una mezcla, deberá hacerse una prueba previa a fin de comprobar la compatibilidad. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados en los cultivos aquí recomendados.

### MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

### GARANTÍA

Sin perjuicio a lo establecido en la ley federal de protección al consumidor, **ALBAUGH MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, garantiza el contenido neto y la composición correcta de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **ALBAUGH MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de **COTRI FLOW** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG\_FT\_DIS\_006

Versión. 00

Fecha de elaboración. 17.ABR.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**