

# FICHA TÉCNICA RODENT CAKE



**NOMBRE COMERCIAL: RODENT CAKE**

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

<b>Ingredientes Activos</b>	<b>% p/p</b>
<b>Difacinona</b> ..... (Equivalente a 0.05 g de I.A. / Kg)	0.005
<b>Ingredientes inertes</b>	
Cereales y aceites grado alimenticio, azúcar, parafina, colorante azul.....	99.995

**REGISTRO SANITARIO COFEPRIS:  
RSCO-RODE-0503-304-033-0.005**

### Rodenticida de uso agrícola

**Bloque parafinado por extrusión. Para uso en áreas húmedas. Resistente al moho y no pierde su palatabilidad ni se hace rancio. El contacto con insecticidas puede modificar el grado de aceptación o apetencia por parte de los roedores.**

#### Instrucciones de uso

Determinense los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo. Para uso agrícola: dentro de las madrigueras, a lo largo de los surcos, sobre la base de los cultivos y en el perímetro de los mismos.

Inspecciónense las áreas tratadas y al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos semanales, hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinfestaciones establézcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repítase el tratamiento.

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México  
Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Lada: 800-2025-017,  
e-mail: [mktridente@tridente.com.mx](mailto:mktridente@tridente.com.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA RODENT CAKE



Utilícese para el control de roedores para la rata común o de alcantarillas; *Rattus novergicus*, Rata Negra; *Rattus rattus* y el Ratón Doméstico; *Mus musculus* de la siguiente forma:

Uso agrícola: Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*).

Grado de infestación	Cebo requerido	Bloques/Punto de cebado	Observaciones
8-5%	2 kg/ha	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación y ubíquese donde el roedor busca en forma natural su alimento, protegiendo los bloques del paso de maquinaria e implementos agrícolas, personas y animales no objeto de control. Preferentemente en el sitio más allá del surco para proteger los cebos de las inundaciones cada 5 a 10 m de distancia o directo a la madriguera. Para aplicación aérea distrese el equipo previamente. Colóquese o aplique el cebo al inicio de cada ciclo y posterior al riego por lo menos 2 veces al año.
Mayor a 15%	3 kg/ha	2 a 3 bloques	

Uso agrícola: Maíz; *Zea mais*, Sorgo; *Sorghum vigare*, Trigo; *Triticum spp*, Avena; *Avena sativa*, Arroz; *Oryza sativa*

Grado de infestación	Cebo requerido	Bloques/Punto de cebado	Observaciones
Ligera	1 a 2 kg/ha	1 a 2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 m de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa.
Moderada	2 a 3 kg/ha	2 a 3 bloques	
Severa	Mínimo 3 kg	Mínimo 3	Trigo, avena y arroz Aplíquese la cantidad de cebo requerida de la misma forma que en el cultivo del maíz. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa o marcolo (arroz)

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Lada: 800-2025-017,

e-mail: [mktridente@tridente.com.mx](mailto:mktridente@tridente.com.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA RODENT CAKE



Uso agrícola: Jitomate; *Solanum lycopersicum*, Lechuga; *Lactuca sativa*, Melón; *Cucumis melo*, Pepino; *Cucumis sativus*, Sandía; *Cucurbita citrulus*, Calabaza; *Cucurbita pepo*.

Grado de infestación	Cebo requerido	Bloques / Punto de cebado	Observaciones
Ligera	1 kg/ha	1 bloque	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 m de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo 4 o 5 semanas antes de la fecha de cosecha. El uso de cebaderos o de tubos facilita el control de cebo y permite a los roedores consumirlo sin recelo.
Moderada	2 kg/ha	2 a 3 bloques	
Severa	Mínimo 3 kg	Mínimo 3	

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se repitan manifestaciones continuas, colóquense cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo una vez que sea necesario. Inscríbase sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA.

## Instrucciones de uso:

- Antes de aplicar este producto, proteja los alimentos y enseres de cocina.
- No se aplique en presencia de personas y animales domésticos.
- No reutilice este envase. Evítese el contacto con ojos.
- Los niños ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en lactación son más susceptibles al riesgo por el uso de este producto, siga correctamente las instrucciones de uso.
- No se deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos. Evítese comer, beber o fumar durante su aplicación.

Evite su ingestión, inhalación y el contacto con los ojos, piel y mucosas, utilícese equipo de protección adecuado para su aplicación: overol, botas y guantes de hule.

## Primeros auxilios:

**ALEJE A LA PERSONA DEL ÁREA**

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LAVE CON ABUNDANTE AGUA**

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Lada: 800-2025-017,

e-mail: [mktridente@tridente.com.mx](mailto:mktridente@tridente.com.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA RODENT CAKE



**EN CASO DE INGESTIÓN:** provóquese el vómito, siempre y cuando el paciente esté consciente. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito, no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de exposición prolongada, retire a la persona del área contaminada, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo. Consúltese al médico inmediatamente.

## **Recomendaciones al médico:**

La difacinona es un rodenticida anticoagulante.

## **Antídoto:**

Vitamina K1 (fitomenadiona). Adminístrese por vía oral, intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bishidroxicumarina. Repítase el tratamiento cuando sea necesario, basándose en la observación del tiempo de protombina. La dosis máxima de vitamina K1 es de 40 mg al día.

## **Medidas para la protección del ambiente:**

Evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua. Durante el manejo del producto no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de agua. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el PLAAMEVA.

## **Almacenamiento y transporte:**

- Consérvese en el envase original en un lugar seco y bien ventilado. Guárdese bajo llave.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.
- No almacenar en casas habitación.

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México  
Teléfono conmutador: 55 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Lada: 800-2025-017,  
e-mail: [mktridente@tridente.com.mx](mailto:mktridente@tridente.com.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>