



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



KOA EXTRA WG

Diuron + Hexazinona

Herbicida

Gránulos dispersables en agua

Fenilamidas / Triazinonas

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-MEZC-1222-0668-343-60

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

DIURON

3-(3,4-diclorofenil)-1, 1-dimetilurea

Equivalente a 533 g de I.A/Kg

53.3

HEXAZINONA

3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona

Equivalente a 67 g de I.A/Kg

6.7

Ingredientes Inertes.

Dispersante, humectante, estabilizante y relleno

40.0

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

KOA EXTRA WG, es un producto formulado como gránulos dispersables en agua a base de DIURON, que actúa como Herbicida sistémico que se absorbe por las raíces e inhibe la fotosíntesis y a base de HEXAZINONA quien actúa de forma no selectiva con acción de contacto e inhibición de la fotosíntesis.

REG_FT_DIS_009

Versión. 00

Fecha de elaboración. 02.MAY.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

HERBICIDAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use quipo de protección personal adecuado incluyendo camisa de manga larga y pantalón largo, googles o lentes de tipo químico, guantes resistentes a químicos, botas de hule y mascarilla con filtros. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.}

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (30)	Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate Azul (<i>Poa annua</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0 – 4.00 kg/ha	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 410 – 510 L agua/ha.
Agave (30)	Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quiebraplato (<i>Ipomoea purpurea</i>) Zacate cola de ardilla (<i>Eragrostis mexicana</i>) Zacate pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	2.0 – 4.0 kg/ha	Realizar una aplicación en post-emergencia temprana dirigida a la maleza cuando ésta tenga menos de 15cm de altura; volumen de aplicación 300 L agua/ha.
Alfalfa (30)	Rama negra (<i>Conyza bonariensis</i>) Rúcula (<i>Eruca sativa</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Pasto conejo (<i>Chloris radiata</i>) Zacate pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pega pega (<i>Setaria viridis</i>)	2.0 – 3.0 kg/ha	Realizar una aplicación foliar en cultivos de más de un año de establecido, 3 a 5 días después del corte y en post-emergencia a la maleza, en suelo semi-húmedo; volumen de aplicación sugerido 200 – 300 L agua/ha.

() Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.





Ficha

Técnica

HERBICIDAS



TIEMPO DE REENTRADA.

12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase de **KOA EXTRA WG** utilizando el equipo de protección personal que se describe en el apartado **"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme.

Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES.

KOA EXTRA WG deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables.

No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD.

KOA EXTRA WG no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_DIS_009

Versión. 00

Fecha de elaboración. 02.MAY.2024

Página 3 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente