



# Ficha

# Técnica

# FUNGICIDAS



## BOSCALID 50 WG

boscalid

Fungicida

Gránulos dispersables en agua

Carboxamida

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  
RSCO-FUNG-0301V-X0457-420-50.0

DISTRIBUIDO POR:  
AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

#### Ingrediente Activo.

##### BOSCALID:

2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida  
(Equivalente a 500 g/kg de i.a.)

50.00

#### Ingredientes Inertes.

Dispersantes, Agente humectante y Vehículo

50.00

TOTAL

100.00

REG\_FT\_DIS\_055

Versión. V00

Fecha de elaboración. 20.NOV.2024

Página 1 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad\_tridente



Agroquímica  
**Tridente**



# Ficha Técnica

## FUNGICIDAS



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, guantes y botas de neopreno; camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón, overol de algodón; lentes de seguridad con protección hermética lateral o careta facial protectora, así como mascarilla con filtro contra polvos y vapores. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

### CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Jitomate (0)	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0.750 – 1.2 kg/ha	Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 450-550 L de agua/ha.
Arándano Frambuesa Fresa Grosella Vid Zarzamora (0)	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	1.0 – 1.2 kg/ha	días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 450-550 L de agua/ha.

( ) Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

### TIEMPO DE REENTRADA.

24 horas

### FORMA DE ABRIR EL ENVASE

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **BOSCALID 50 WG** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación

### CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

### INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **BOSCALID 50 WG** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.





# Ficha Técnica

## FUNGICIDAS



### MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

