



Ficha Técnica

Difarat A10

Difacinona

Rodenticida

Bloque parafinado

Indandiona

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-RODE-0503-304-033-0.005

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
DIFACINONA: (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	0.005
Ingredientes Inertes.	
Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul	99.995
TOTAL	100.000

MODO DE ACCIÓN.

Difarat A10, es un producto formulado como Bloques parafinados a base de DIFACINONA. Pertenecer a un grupo de sustancias químicas llamadas anticoagulantes indandiona, inhiben la producción de vitamina K activa, lo que disminuye la síntesis de factores de coagulación sanguínea.

REG_FT_DIS_067

Versión. V00

Fecha de elaboración.30.JUN.2025

Página 1 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

- Evítese comer, beber o fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lávese con agua abundantemente.
- Utilícese equipo de protección adecuado para su aplicación: overol y guantes.

TABLA DE DOSIS

ALMACENES Y BODEGAS			
	GRADO DE INFESTACIÓN	NO. DE BLOQUES/PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Rata	Ligera a moderada severa	2 a 6 8 a 16	Colóquese la cantidad de cebo indicado por punto o directo a madriguera cada 5 a 10 m.
Ratón		2	Colóquese 1 bloque por punto cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.
CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>)			
GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: Kg /ha	NO. DE BLOQUES/PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
8-15%	2kg	2 a 6 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación y ubíquese donde el roedor busca en forma natural su alimento, protegiendo los bloques del paso de maquinaria e implementos agrícolas, personas y animales no objeto de control. Preferentemente en el sitio más distante del surco para proteger los cebos de las inundaciones cada 5 a 10 metros de distancia o directo a la madriguera. Colóquese o aplique el cebo al inicio de cada ciclo o posterior al riego por lo menos 2 veces al año.
Mayor 15%	3kg	8 a 16 bloques	
MAÍZ (<i>Zea mays</i>) SORGO (<i>Sorghum vulgare</i>) TRIGO (<i>Triticum spp</i>) AVENA (<i>Avena sativa</i>) ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)			
GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: Kg/ha	NO. DE BLOQUES/PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
LIGERA	1 a 2 kg	2 a 3 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa.
MODERADA	2 a 3 kg	4 a 6 bloques	

REG_FT_DIS_067

Versión. V00

Fecha de elaboración. 30.JUN.2025

Página 2 de 4



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha Técnica

SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 8	TRIGO, AVENA Y ARROZ Aplíquese la cantidad de cebo requerida de la misma forma que en el cultivo de maíz. Colóquese el cebo al inicio de la fase vegetativa o macollo (arroz).
JITOMATE (<i>Lycopersicum esculentum</i>) PEPINO (<i>Cucumis sativus</i>)		LECHUGA (<i>Lactuca sativa</i>) SANDIA (<i>Cucurbita citrullus</i>)	MELÓN (<i>Cucumis melo</i>) CALABAZA (<i>Cucurbita pepo</i>)
GRADO DE INFESTACIÓN	CEBO REQUERIDO: Kg /ha	NO. DE BLOQUES/PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
LIGERA	1kg	2 bloques	Aplíquese la cantidad de cebo indicada de acuerdo al grado de infestación cada 5 a 10 metros de distancia o directo en la madriguera. Colóquese el cebo o de tubos facilita el control del cebo y permite a los roedores continuar el consumo.
MODERADA	2kg	6	
SEVERA	Mínimo 3kg	Mínimo 8	

Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, Sin Límite (S/L)

TIEMPO DE REENTRADA.

Inmediata.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Determinése los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspecciónese las áreas tratadas al tercer día repóngase el cebo consumido.

Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones.

Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos semanales, hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños para prevenir reinfestaciones establézcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repítase el tratamiento.

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se repitan reinfestaciones continuas, colóquese cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario. Inscríbase sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA.

CONTRAINDICACIONES:

Este producto es un cebo de aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se debe mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar el rechazo de cebo por los roedores.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.





Ficha Técnica

"GARANTÍA"

SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

