



Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



ENRAIZER-N ENRAIZADOR

Regulador de Crecimiento

Líquido

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-253/X/2012

TITULAR DEL REGISTRO

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

	%
Ácido 3 Indol Butírico (-)	0.30
Nicotinamida (-).....	0.30
Zinc (Zn) (como Quelato de Zinc).....	0.30
Fósforo (P ₂ O ₅).....	2.00
Potasio (K ₂ O)	2.50

INFORMACIÓN GENERAL.

ENRAIZER-N ENRAIZADOR es un regulador de crecimiento con base en auxinas naturales que promueven el enraizamiento de esquejes herbáceos, esquejes leñosos, esquejes semileñosos y estaquillas. Por su formulación, actúa sobre la división y elongación celular. Es apto para utilizarse en el tratamiento material vegetativo de la reproducción de coníferas frutales, de hoja caduca, frutales, subtropicales y hortalizas. Después del trasplante favorece el desarrollo radicular, aumentando el crecimiento de raíces adventicias y pelos radiculares.

Beneficios: se obtienen raíces más fuertes y sanas, mejorando la absorción de nutrientes y la capacidad de síntesis hormonal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Lea cuidadosamente las instrucciones y use el equipo de protección para la manipulación del producto el cual debe ser: camisa de manga larga u overol de algodón, guantes y botas de neopreno y gafas de seguridad con protección lateral. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo: báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. La ropa empleada durante el trabajo debe lavarse por separado.





Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



CULTIVOS RECOMENDADOS.

MODO DE APLICACIÓN: SUELO

Cultivo	Dosis ml/L de agua	Aplicación
Jitomate, pimiento, chile	3-5 ml	Aplicar al suelo con una lanza a manera de inyector dirigido a la base de las plantas en almácigo.
	5-10 ml	Aplicar al suelo con una lanza a manera de inyector dirigido a la base de las plantas al momento del trasplante.
	5-10 ml	Aplicar al suelo con una lanza a manera de inyector dirigido a la base de las plantas a los 10 días después del trasplante.
Calabacita, ajo, col, coliflor, fresa, pepino, melón y sandía.	5 ml	Aplicar cada semana en almácigo con sustrato húmedo.
Calabacita, ajo, col, coliflor, fresa, pepino, melón, sandía, uva y alcachofa.	10 ml	Una semana después del trasplante y repetir a la siguiente semana (no hacer más de dos repeticiones).
Frutales de hoja caduca*, frutales tropicales*, ornamentales leñosas y viñedos.	10-15 ml	Aplicar una semana después del establecimiento y en primavera (inicio de brotación de hojas y flores) en caso de árboles de hoja caduca.

MODO DE APLICACIÓN: POR INMERSIÓN

Cultivo	Dosis ml/L de agua	Aplicación
Calabacita, ajo, cebolla, fresa, pepino, melón y sandía	10 ml	Hacer inmersiones unos segundos de cepellones, varetas, estacas, tubérculos o acodos antes de trasplante o siembra.
Vid	10 ml	Aplicación mediante inmersión de los esquejes cortados de la planta madre en la solución por un lapso de 12 horas.
Ornamentales leñosos, frutales tropicales*, frutales de hoja caduca o de difícil brotación radicular*.	10-15 ml	Hacer inmersiones instantáneas de esquejes u órganos de reproducción vegetativa

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

En un tanque de premezcla con 100 a 200 L de agua agregue el producto en la cantidad para cada cultivo. Agite la solución hasta que este perfectamente mezclado. Ajustar pH a 7.

Aplicación foliar o en base de las plantas: siempre calibre su equipo de aplicación. Aplicar al cultivo mediante mochilas aspersoras en caso de aplicación foliar o en la base de la planta según se muestra en la tabla de esta etiqueta.

Aplicación por inmersión: Hacer inmersiones de los esquejes u órganos de reproducción vegetativa en el tiempo que indica la tabla mostrada en esta etiqueta.

REG_FT_NUT_009

Versión. 00

Fecha de elaboración. 03.OCT.2024

Página 2 de 3



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



Forma de abrir el envase:

Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa. Realice esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras y evite tocar e inhalar el producto.

Equipo de aplicación: se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión, ya sea mecánico o manual.

INCOMPATIBILIDAD

Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, pero se recomienda realizar una prueba antes de mezclar y previo a la aplicación en campo.

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., garantiza la composición correcta del producto por los ingredientes que se especifican en la etiqueta, siempre que el usuario lo adquiera en su envase original cerrado. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

