



Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



AMINOBALANZ

Fertilizante orgánico

Líquido

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-103/VIII/16

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

	% (p/p)
Aminoácidos Libres.....	24.00
Nitrógeno (N) total.....	6.50
Nitrógeno (N) orgánico	6.00
Fósforo (P ₂ O ₅).....	1.00
Potasio (K ₂ O)	1.00
Materia orgánica total.....	30.00

MATERIAS PRIMAS

Proteína de origen animal

INFORMACIÓN GENERAL.

AMINOBALANZ, es una formulación a base de L- α aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular procedente de hidrólisis enzimática. El producto aporta Nitrógeno Orgánico de rápida asimilación procedente íntegramente de los aminoácidos al no activarse nitrógeno alguno en su formulación.

El elevado contenido de materia orgánica del producto supone una ventaja añadida en las aplicaciones radiculares, al mejorar las características físico-químicas del suelo próximo al sistema radicular. **AMINOBALANZ** constituye un aporte estimulante para las plantas, reforzando y activando numerosos procesos fisiológicos.

REG_FT_NUT_DIS_002

Versión. 00

Fecha de elaboración. 15.MAY.2024

Página 1 de 2



Agroquímica Tridente



www.tridente.com.mx



calidad_tridente



Agroquímica
Tridente



Ficha

Técnica

NUTRICIÓN



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación del producto: durante su manejo y aplicación se recomienda usar un overol completo de PVC, lentes de protección de plástico o goggles de plástico y guantes de látex desechables, mascarilla con filtros y respiradores para vapores.

CULTIVOS RECOMENDADOS.

HORTÍCOLAS

Acelga, Ajo, Apio, Betabel, Brócoli, Calabacita, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Espárrago, Espinaca, Jitomate, Lechuga, Melón, Papa, Pepino, Sandía y Zanahoria.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Tabaco.

ORNAMENTALES

Begonia, Clavel, Crisantemo, Dalia y Gladiolo.

CUADRO DE DOSIS.

CULTIVO	DOSIS
Aplicación foliar	Realizar aspersiones de 200-300 mL/100L de agua (3-6 L/ha) por aplicación durante los periodos críticos.
Aplicación radicular	Aplicar a través del agua de riego entre 10 a 15 L/ha cada 7-15 días.

ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Los momentos de aplicación deben coincidir con los momentos más críticos para el cultivo. Se aconseja su utilización en trasplante, inicio de la vegetación, floración y desarrollo de los órganos a recolectar.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el producto antes de mezclarlo con el agua para obtener mejores resultados una vez diluido, use el producto dentro de las 24 horas de su dilución para evitar el deterioro del producto. Para abrir el envase, rompa el sello de seguridad de la tapa y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Mezclar en una cubeta la cantidad de producto a utilizar y añadir al tanque de aplicación o al dosificador si se trata de inyección al sistema de riego.

COMPATIBILIDAD

Solo deberá mezclarse con productos registrados y en los cultivos autorizados. Si se quiere mezclar con compuestos cúpricos, de azufre o de reacción alcalina, realizar una prueba de compatibilidad.

MANGRATEC MEXICO, S.A. DE C.V., garantiza únicamente la formulación y el contenido del producto. Consérvese en su envase original, evitando las condiciones extremas de temperatura.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (ATOX), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

