



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



MOSQUITION 44 ME

Malation

Insecticida

Microemulsión

Organofosforado

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
RSCO-USP-46-2017
TITULAR DEL REGISTRO
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (p/p)
Ingrediente Activo.	
Malation	
Dietil (dimetoxifosfinotioiltio)succinato	41.31
Equivalente a 440 g/L a (20°C)	
Ingredientes Inertes.	
Tensoactivo y Disolventes	58.69
TOTAL	100.00

MOSQUITION 44 ME es para uso exclusivo en campañas de Salud Pública para el control de MOSQUITOS de la especie *Aedes aegypti* que transmite el virus del Dengue, Zika y Chinkungunya. MOSQUITION 44 ME puede ser utilizado en campos rurales, campos agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros en campañas de Salud Pública; así como en cualquier zona impactada por sismos, tormentas e inundaciones y cualquier otra zona afectada por algún desastre natural.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
Para manipular el producto debe usar camisa de manga larga, pantalón, guantes, botas o zapatos cerrados, casco industrial, lentes de seguridad y mascarilla contra gases y vapores. Después de una jornada de trabajo báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Lavar bien y por separado, con agua y jabón, la ropa utilizada en el trabajo y almacenar después de la jornada laboral en el lugar de trabajo.



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

Aplicación Ultra Bajo Volumen	Plaga (Nombre común)	DOSIS	
		Mezcla (mL de MOSQUITION 44 ME / en mL de agua)	Rendimiento
Flujo regulable (posidrive)	Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>)	250 mL-300 mL de producto en 800 mL – 700 mL de agua	Para aplicación terrestre utilizar 112 g de I.A. por hectárea.
Flujo fijo con boquilla o disco			

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No se podrá ingresar a los lugares tratados por 1 hora. Previo al ingreso al área tratada, se debe ventilar el lugar por al menos 30 minutos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de las plagas, por lo que, si es necesario, se deberá aplicar a un intervalo de 15 a 21 días, posteriormente una vez al mes.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase utilice el equipo de protección personal adecuado (camisa de manga larga, pantalón, guantes, botas o zapatos cerrados, casco industrial, lentes de seguridad y mascarilla contra gases y vapores). Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto. Agregar el total de agua limpia conforme al volumen total de mezcla a utilizar en el tanque del equipo, verter la proporción indicada de MOSQUITION 44 ME en el mismo recipiente, la mezcla se homogenizará con el movimiento del equipo. Solo preparar la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar.

APLICACIÓN TERRESTRE DE ULTRA BAJO VOLUMEN: Calibre su equipo para que aplique la cantidad de 112 g de ingrediente activo por hectárea a un flujo de 416 mL/min a 420 mL/min en un vehículo con una velocidad promedio de 10 Km/h.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso. No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. En aplicaciones exteriores, no aplicar cuando el viento supere los 15 Km/h. No se recomienda mezclar este producto con otros agroquímicos.

AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICION CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

REG_FT_0023

Versión. 00

Fecha de elaboración. 11.SEP.2024

Página 2 de 2

