



Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



BENDIOCARB 80% PH

Bendiocarb

Insecticida

Polvo humectable

Carbamato

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO

RSCO-USP-42-2017

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% (p/p)

Ingrediente Activo.

BENDIOCARB:

2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilcarbamato
(Equivalente a 800 g de I.A./kg)

80.0

Ingredientes Inertes.

Humectante, dispersante y carga

20.0

TOTAL 100.00

MODO DE ACCIÓN.

BENDIOCARB 80% PH es un insecticida del grupo de los Carbamatos, en presentación de Polvo Humectable, actúa por contacto e ingestión sobre las plagas de insectos aquí señalados.

REG_FT_DIS_024

Versión. 00

Fecha de elaboración. 25.SEP.2024

Página 1 de 3





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante las operaciones de formulación y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo: overol, botas de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con respirador y guantes resistentes a químicos. Después de terminar la jornada laboral, lave el equipo de protección personal con agua limpia y jabón. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Almacenar el equipo de protección personal en el lugar de trabajo y bajo llave después de la jornada laboral.

CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES.

PLAGA	DOSIS (g de producto / 10 L de agua)	OBSERVACIONES
Mosquitos <i>Aedes spp.</i> <i>Anopheles spp.</i> <i>Culex spp.</i>	125 g de producto (equivalente a 400 mg de i.a./m ²) Bomba Hudson X-Pert, boquilla 8002, 8002 E, abanico, presión 55 psi, gasto de 760 ml/min.	Rendimiento: la mezcla preparada rinde para 250 m ² de superficie. Residualidad en superficies porosas: 4 meses. Residualidad en superficies lisas: 6 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN: Casas / Apartamentos / Hoteles / Barcos / Aeronaves

TIEMPO DE REENTRADA.

Se deberá esperar un periodo de 30 minutos posteriores a la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN.

El intervalo de aplicación depende del grado de infestación que se presente y de la superficie tratada, por lo que se recomienda una aplicación cada 120 a 180 días.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Debe de determinarse el área que se tratará para calcular la cantidad de producto a ocupar.

Corte el sobre por la parte superior con unas tijeras o un objeto filoso con precaución. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con agua y las dosis a emplear de BENDIOCARB 80% PH. Una vez que el sólido se disuelva por completo, vierta esta premezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. Mantener la mezcla en constante agitación para asegurar una aplicación uniforme.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en contra viento. Deben limpiarse las superficies donde hayan caído brisas o gotas que no sean objeto del rociado con un trapo húmedo.

INCOMPATIBILIDAD.

El producto BENDIOCARB 80% PH no debe mezclarse con otros plaguicidas.

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.





Ficha Técnica

LÍNEA URBANA



En caso de intoxicación por agroquímicos, comunicarse al **800-000-28-69**; programa de Atención a inTOXicaciones (**ATOX**), atendido por personal médico especializado los 365 días del año, las 24 horas.

